

加力體能 1 公克咀嚼錠

Carnitene 1g chewable tablets

衛署罕藥輸字第 000006 號

本藥須由醫師處方使用

【成分】

1 公克咀嚼錠

每錠含主成分：L-carnitine inner salt 1 公克

其它成分：mint aroma 1 x 2000；licorice aroma；compressible sucrose；magnesium stearate

【劑型及包裝】

10 錠 1 公克咀嚼錠

【藥理分類】

粒腺體之協同劑

【適應症】

用於先天遺傳性代謝異常的續發性 Carnitine 缺乏症病患之急慢性治療。

【禁忌】

對藥物中任何成分過敏者。

【注意事項】

由於會改善葡萄糖之利用，當和胰島素或其他口服降血糖藥併用於糖尿病病患時可能導致低血糖。此類病患必須定期作血糖的監測以便有需要時作為低血糖治療調整的依據。

本品含蔗糖，當治療糖尿病患者或接受飲食控制以減少卡路里攝取的病人時，必須謹慎考慮。

【藥物交互作用】

未知。

【警語】

對開車及操作機械的影響：

L-Carnitine 對開車及操作機械並無影響。

【用法用量】

因先天代謝疾病產生之續發性缺乏：每日建議口服劑量與年齡及體重的關係：0-2 歲建議每日劑量 150 mg/公斤，2-6 歲 100 mg/公斤，6-12 歲 75 mg/公斤，大於 12 歲以上及成人 2-4 克，依病情的嚴重性做調整。

【副作用】

口服後曾有輕微之胃腸道症狀的報告。尿毒症病患中曾有肌無力（myasthenia）之輕微症狀的報告。曾有或無癲癇病史的病患中，曾有口服或注射 Levocarnitine 後癲癇發作病例的報告。

如依照本仿單之用法說明，可減少副作用的發生。

任何未在仿單中記載的副作用必須立刻通知治療之醫師或藥師。

此藥必須保存於孩童未及之處。

【注意】

藥品超過外盒所標示的保存期限後請勿使用。

製造廠：Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

(P) Via Pontina Km 30,400-00040 Pomezia (Rome), Italy

(O) Viale Shakespeare, 47-00144 Roma, Italy

藥商：翰亨實業股份有限公司

台北市中山區建國北路二段 87 號 3 樓之 1

(02) 2507-4999