

## 品名：Tyrex<sup>®</sup>-2

添加鐵質限制胺基酸醫療食品

不含苯丙胺酸及酰胺酸

重量/包裝：400g/罐

### 適應症：

- 僅供經醫師診斷確認有酰胺基酸症 I, II, III 型之小孩或成人使用。
- 使用本產品時，必須再額外補充精確量的蛋白質及水分，以符合苯丙胺酸、酰胺酸及水分的需要量。本品非供靜脈注射使用。
- 本品非 1 歲以下嬰兒使用。

### 使用說明：

請依醫師指示使用正確沖泡。持續食用不適當沖泡的醫療食品可能會造成疾病。

### 沖泡指示：

各病患會因不同的需要而有不同的沖泡指示。請遵照醫師指示沖泡。

### 沖泡 24 小時量：

1. 將指示量的 Tyrex<sup>®</sup>-2 及其他成分放入混合容器中。Tyrex<sup>®</sup>-2 須以可讀到公克的秤精確秤量。
2. 加入適量室溫的水以調製成 24 小時的需要量。
3. 以攪拌器攪拌不超過 4 秒鐘或將容器蓋子蓋緊充分搖晃 10-12 秒。
4. 將沖泡好的混合液蓋上蓋子，儲存於冰箱冷藏室中備用。
5. 每次食用前請充分混合均勻，直接低溫飲用。
6. 請於沖泡後 24 小時內使用完畢。

### 有用的小秘方：

當您食用此醫療食品要除去口中藥味時，可試著吃一片蘋果、喝汽水、嚼有甜度的口香糖或含一顆糖果。

### 注意事項

- 本產品須遵照醫囑使用。
- 不適合一般靜脈注射之用。
- 本醫療食品不可以高溫加熱或烹煮。

### 保存方式

- 本產品請放置於乾燥或陰涼處。
- 開瓶之後應蓋好罐蓋請放置於冰箱並在一個月內使用完畢。
- 請於罐底標示之有效期限內使用完。

### 營養標示

每 100 公克

Calories 熱量	410 大卡
Protein 蛋白質	30.0 公克
Fat 脂質	14.0 公克
Carbohydrate 醣類	35.0 公克
Linoleic acid	2200 毫克
Linolenic acid	225 毫克
L-Carnitine	40 毫克

Vitamin A 維生素 A	660 微克當量
Vitamin D 維生素 D	7.5 微克
Vitamin E 維生素 E	12.1 毫克 α-當量
Vitamin K 維生素 K	60 微克
Thiamin 維生素 B1	3.3 毫克
Riboflavin 維生素 B2	1.8 毫克
Vitamin B6 維生素 B6	1.3 毫克
Vitamin B12 維生素 B12	5.0 微克
Niacin 菸鹼酸	16 毫克
Folic acid 葉酸	450 微克
Pantothenic acid 泛酸	8.0 毫克
Biotin 生物素	100 微克
Vitamin C 維生素 C	60 毫克
Choline 膽鹼	100 毫克
Inositol 肌醇	70 毫克
Calcium 鈣	880 毫克
Phosphorus 磷	760 毫克
Magnesium 鎂	225 毫克
Iron 鐵	13 毫克
Zinc 鋅	13 毫克

Manganese 錳	0.8 毫克
Copper 銅	1 毫克
Iodine 碘	100 微克
Selenium 硒	35 微克
chromium 鉻	27 微克
molybdenum 鉬	30 微克
Sodium 鈉	880 毫克
Potassium 鉀	1370 毫克
Chloride 氯	940 毫克

製造廠：美國亞培大藥廠羅斯產品部

地址：COLUMBUS, OHIO 43215-1724 USA

進口商：美商亞培股份有限公司台灣分公司

地址：台北市民生東路三段 51 號 6 樓

免費服務專線：0800-008-828

本單張無法詳載完整特殊營養食品資訊，若有任何疑問，歡迎與我們聯絡。

諮詢專線：04-2205-2121 轉 7169、  
7170

罕見疾病物流中心

## 特殊營養食品

# Tyrex® -2

